

ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΧΡΗΣΤΕΣ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (ΧΨΟ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Άγγελος Χατζάκης, Καθηγητής
Επιδημιολογίας και Προληπτικής
Ιατρικής ΕΚΠΑ

HIV/AIDS ΣΕ ΧΨΟ

Βάνα Σύψα, Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και
Προληπτικής Ιατρικής ΕΚΠΑ




Πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ HIV-ΗCV 2018-2020 (Αθήνα)

Πρόγραμμα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2019-2021 (Θεσσαλονίκη)

- Σύνολο ΧΨΟ: 2.406
- Μέση διάρκεια παρακολούθησης: 2,7 έτη
- Σύνολο θανάτων (Απρ. 2018-Μάιος 2022): 241
- Θνησιμότητα: Σύνολο: 3,5% ανά έτος
Αθήνα: 3,0% ανά έτος
Θεσσαλονίκη: 4,6% ανά έτος
- Η θνησιμότητα αυτή είναι **17** φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη σε άτομα ίδιας ηλικίας και φύλου στο γενικό πληθυσμό (**34** φορές μεγαλύτερη για τους **HIV(+)**)

Θνησιμότητα ΧΨΟ σε Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Αυστραλία, Ελλάδα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη



Δεδομένα για Ευρώπη, Β. Αμερική και Αυστραλία από 84 μελέτες (Larney S. et al JAMA Psychiatry 2020)

Διαχρονική πορεία θανάτων και θνησιμότητας σε ΧΨΟ στην Ελλάδα (2018-2022) σε ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ HIV/HCV και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ

	2018 (Απρ.-Δεκ.)	2019	2020	2021	2022 (Ιαν.-Μάιος)
Θάνατοι	14	28	63	92	44
Θνησιμότητα (θάνατοι % ανά έτος)	2.6	2.3	3.2	4.1	4.7



Το 2022 αναμένονται >100 θάνατοι
σε ΧΨΟ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ HIV/HCV
και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Οι ΧΨΟ που συμμετείχαν στον
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ και τον ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
αποτελούν το 13%-20% των ΧΨΟ της
χώρας, σύμφωνα με τα δεδομένα του
ΕΚΤΕΠΝ (2021)

Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε **500-800**
θανάτους στο σύνολο της χώρας, στη
διάρκεια του 2022

HIV/AIDS ΣΕ ΧΨΟ

Βάνα Σύψα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Επιδημιολογίας και Προληπτικής
Ιατρικής ΕΚΠΑ



Προγράμματα στην κοινότητα για την ενίσχυση της διάγνωσης & διασύνδεσης στη θεραπεία για HCV & HIV

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ HCV-HIV

(Αθήνα, 2018-Μάρτιος 2020)

1.634 συμμετέχοντες

- 75% ενεργοί ΧΕΝ
- 27% άστεγοι
- 77% εκτός προγραμμάτων υποκατάστασης με οπιοειδή

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

(Θεσσαλονίκη 2019-2021)

1.101 συμμετέχοντες

- 54% ενεργοί ΧΕΝ
- 20% άστεγοι
- 80% εκτός προγραμμάτων υποκατάστασης με οπιοειδή

Πρόσβαση σε δωρεάν σύριγγες και έλεγχο για HIV

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΗCV-HIV

(Αθήνα, 2018-Μάρτιος 2020)

Τους τελευταίους 12 μήνες

- 43 % είχε λάβει δωρεάν σύριγγες*
- 47% είχε κάνει HIV τεστ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ


(Θεσσαλονίκη 2019-2021)

Τους τελευταίους 12 μήνες

- 5% είχε λάβει δωρεάν σύριγγες*
- 25% είχε κάνει HIV τεστ

*μεταξύ αυτών που ανέφεραν ενέσιμη χρήση τους τελευταίους 12 μήνες

Επίπτωση HIV σε ΧΕΝ στην Αθήνα (2012-2020) και στη Θεσσαλονίκη (2019-2020)



HIV σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – κύρια σημεία

Αθήνα (2018-2020):

- Τα επίπεδα μετάδοσης HIV παραμένουν στα επίπεδα που είχαν επιτευχθεί στα τέλη του 2013 – όχι περαιτέρω βελτίωση
- Αύξηση επιπολασμού (% θετικών για HIV): 14.2% το 2012-2013 → 22.0% το 2018-2020
- Επιδείνωση κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών των ΧΨΟ, αύξηση στη χρήση κοκαΐνης, μειωμένη πρόσβαση σε προγράμματα διανομής συρίγγων

Θεσσαλονίκη (2019-2021):

- Χαμηλή κάλυψη προγραμμάτων διανομής συρίγγων & ελέγχου HIV
- Εξελισσόμενη επιδημία HIV λοίμωξης στους ΧΕΝ της Θεσσαλονίκης - τα 2/3 των HIV(+) ήταν νέες διαγνώσεις
- Αύξηση επιπολασμού HIV από <1 το 2018 σε 7.1% το 2019-2021 (10πλασιασμός)
- Δυσκολία στη διασύνδεση σε θεραπεία λόγω της πανδημίας